


Представяме GIOTRIF®

**Стъпка нагоре към
безпрецедентна ефикасност
при лечение от първа линия†**

спрямо pemetrexed/cisplatin при
пациенти с авансирал НДКРБД
с EGFR M+^{1,2}

**Първият необратим блокер на ErbB фамилията, одобрен за
авансирал НДКРБД с позитивна EGFR мутация (EGFR M+)**



GIOTRIF® 20 mg филмирани таблетки. Една филмирана таблетка съдържа 20 mg афатиниб (afatinib)
GIOTRIF® 30 mg филмирани таблетки. Една филмирана таблетка съдържа 30 mg афатиниб (afatinib).
GIOTRIF® 40 mg филмирани таблетки. Една филмирана таблетка съдържа 40 mg афатиниб (afatinib).
GIOTRIF® 50 mg филмирани таблетки. Една филмирана таблетка съдържа 50 mg афатиниб (afatinib).

Лекарствен продукт по лекарско предписание. Преди да предпришете Giotrif®, моля прочетете кратката характеристика (КХП) на лекарствения продукт:

<http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h879.htm>

Дата на КХП: 24.09.2015

КХП може да Ви бъде предоставена и от медицински представител на Бьорингер Ингелхайм.

▼ Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана лекарствена реакция.

*PFS (Progression free survival) - Преживяемост без прогресия

† Data from registrational trial


НОВО
GIOTRIF®
(afatinib) таблетки
ПОВИШАВАЩ ОЧАКВАНИЯТА

Стъпка нагоре с GIOTRIF®: 13.6 месеца медиана на преживяемост без прогресия (PFS) - първа линия на лечение спрямо pemetrexed/cisplatin при пациенти с чести мутации^{1,2}

PFS според независима оценка (първична крайна цел)^{1,2}

Предварително планиран подгрупов анализ

ексон 19 делеции или ексон 21 L858R точкови мутации (~90% от всички мутации)



Към момента на първичния анализ за общо 45 (20%) пациенти, лекувани с GIOTRIF® и 3 пациенти (3%), лекувани с химиотерапия е известно, че са живи и без прогресия на заболяването, като тези резултати са цензурирани в горната графика.

- **53% намаляване на относителния риск от смърт или туморна прогресия при пациенти с чести мутации (HR 0.47; P<0.001)**
- 51% от пациентите с често срещани мутации са живи и без прогресия на заболяването след 12 месеца и 29% след 18 месеца (спрямо 21% и 7.4%, съответно за pemetrexed/cisplatin)

НАПРАВЕТЕ СЪПКА-ПРЕДЛОЖЕТЕ НА ВАШИТЕ ПАЦИЕНТИ ШАНС ЗА ЗНАЧИМИ ПОЛЗИ ОТ ПРЕЖИВЯЕМОСТ БЕЗ ПРОГРЕСИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО (PFS) С GIOTRIF® СПРЯМО Pemetrexed/CISPLATIN^{1,2}

References: 1. Sequist LV, Yang JC, Yamamoto N, et al. Phase III Study of Afatinib or Cisplatin Plus Pemetrexed in Patients With Metastatic Lung Adenocarcinoma With EGFR Mutations. J Clin Oncol. 2013;31(27):3327-3334.
2. Giotrif® Summary of Product Characteristics 2015.


НЕКА ДА РАБОТИМ
ОНКОЛОГИЯ ОТ БЪОРИНГЕР ИНГЕЛХАЙМ



Boehringer
Ingelheim

За пълна информация:

Представителство за България
Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко КГ – клон България
София 1505, Сердика Офиси, бул. Ситняково 48, ет. 8
тел.: 02/958 79 98



НОВО

GIOTRIF®

(afatinib) таблетки

ПОВИШАВАЩ ОЧАКВАНИЯТА